


Riassunto stazione meteorologica di CIVIDALE - Rubignacco : ESTATE 2007



CIVIDALE 2007	TEMPERATURE MEDIE						PRECIPITAZIONI	
	min °C	diff. 1978-06 °C	max °C	diff. 1978-06 °C	media °C	diff. 1978-06 °C	totali mm	diff. 1912-06 mm
GIU	17,0	2,3	27,8	2,1	22,4	2,2	114,3	-60,2
LUG	17,0	0,5	30,2	1,7	23,6	1,1	100,1	-31,5
AGO	16,1	-0,2	28,2	-0,4	22,2	-0,3	152,1	12,9
estate	16,7	0,9	28,7	1,1	22,7	1,0	366,5	-78,8

ESTATE 2007: relativamente calda e secca. Finalmente, dopo 4 stagioni consecutive molto calde siamo rientrati nella normale variabilità climatica. E dopo 12 mesi consecutivi con temperatura sopra media agosto è sceso, seppur di poco, sotto media. Una stagione quindi senza eccessi, calda e secca in giugno, poi quasi in media termica e più piovosa.

GIUGNO 2007: Giugno conferma ancora una volta di essere diventato un mese prettamente estivo e di aver abbandonato definitivamente le sue caratteristiche di mese di transizione tra la primavera e l'estate. La temperatura media massima si avvicina sempre di più a quella dei mesi caldi per antonomasia quali luglio ed agosto e le piogge si riducono assumendo quasi esclusivamente carattere temporalesco. L'unico episodio da segnalare è la grandinata del 20 sera con chicchi di grosse dimensioni che ha interessato le zone più alte delle valli del Natisone (Montemaggiore ed il monte Matajur in particolare).

LUGLIO 2007: è nel mese di luglio che si concentrano gli eventi meteo più significativi della stagione. Nella prima decade dominano correnti nord-occidentali umide e fredde. Un vero e proprio fronte freddo interessa la nostra regione il giorno 4 con diffusi rovesci temporaleschi ed un brusco calo termico (tra le 12 e le 15 la temperatura scende di oltre 10 gradi). La mattina successiva la temperatura minima è particolarmente bassa, quasi da record. Segue una breve fase anticiclonica con temperature in deciso aumento. Ma il giorno 9 l'arrivo di aria particolarmente fredda in quota genera temporali diffusi e grandinigeni (tra le ore 19 e le 20 cadono chicchi di grosse dimensioni tra Grupignano e Rubignacco).

Segue una fase calda e secca per il temporaneo espandersi verso nord-est dell'anticiclone africano. E' questo l'unico periodo veramente caldo della stagione: il 19 si sfiorano i 38 gradi.

La cupola anticiclonica resiste, anche se indebolita, fino a fine mese per poi cedere definitivamente la scena alle correnti atlantiche fresche ed instabili che caratterizzeranno il

mese di agosto. La giornata che fa da spartiacque tra il caldo africano e quello oceanico è quella del 30 in cui la temperatura scende bruscamente e la bora raggiunge a Cividale i 100 km/h.

AGOSTO 2007: sembra confermare l'andamento degli ultimi anni: relativamente fresco e piovoso. Dopo l'innominabile 2003 in agosto l'estate sembra concedere un break importante alle correnti occidentali o addirittura cedere il passo all'autunno. Ritorna dall'attualità il famoso detto popolare che la prima pioggia di agosto rinfresca il bosco. Ma andiamo nel dettaglio: dominio del flusso occidentale con alternanza di giornate belle e frequenti episodi di instabilità temporalesca. E' a cavallo della prima e seconda decade del mese che si concentra il maltempo e la temperatura si mantiene quasi costantemente sottomedio fino al giorno 24. In particolare nella giornata del 20 pomeriggio si verificano forti rovesci temporaleschi con accumuli di oltre 60 mm in 2 ore.